## 庫全書

子部

欽定四庫全書

7 子部 普濟方卷三百七十七

編修臣倉聖脈覆勘 詳校官太醫院吏目臣同世泰

校對官中書臣朱總校官進士臣終 謄録 監生 臣趙廷麒

炕

琪

**欽定四車全書** 成已上為順十成已下為順其發之狀或口 附論。 香酒方 者疾名謂何安所得之此伯 母腹中時母或感驚恐上 周王朱橚 )果氏病源痼者小 撰

所舍其藏堅固不受外邪若風熱蘊積乗於心則令恍 反折由風邪熱毒傷於手少陰之經故也心為帝王神之 眼相引而目睛上搖或手足掣飛或背脊强直或腔上 ,兒在胎之時其母卒有大驚精神失守則今子癩 安精神離散榮衛氣亂陰陽相病故發為癲癇也 二歳發癎至大不

改定四華全書 四 多牛黄及分兩不同 右和蜜丸四五歳服大豆大十九與顱顖經樂 時口出白沫并大小便出不知 柴胡 龍崗 虎睛 升麻 4 三 一年多黄 栀子仁 白鮮皮 蛇蜕皮分支 普遍方 丹砂 銀屑分四 牛黄分半 細辛一分 鐵精 雷九是各 蜂房炎 中野 四首去 題 子学 石膏分五 ÷ 羗活 オ后

治小兒熱癇癲 行り日月 便淋瀝不利治之 右用蚯蚓破之去泥以鹽塗之化成水服 虎睛 直沒今黃色 節分 11 治孩子從一歲至大癲發無時口出白沫上 動藤か 銀屑 栀子仁 雷九焼令人 鐵精 港三百 t 1 防炎 羌活 A 四 細辛 柴胡

欽定四車全書 右研為末煉塞為九四五歲如赤豆大五九日再服 大小便出不知 大兒十九米飲下忌生冷油膩等物 虎睛 龍齒 蛇皮五寸 治小兒癲癇至大不瘥或發即口出白沫 有微泉細 門對酒浸 細研各 ρŤŋ 露蜂房微 普濟方 **非蟬** 四枚去 羌 活 細辛分 石膏系細 鈎縣 防炎 粉

迷悶 右件都研令匀煉塞和九如麻子大每服以温水 **五九更量兒大小加减 蚱**單四枚去 鐵粉 星分分 治小見心臓積 細水 研銀 点田 兩 7 研 熟時發癲癇嘔吐涎 ٤ 鉛霜 1 飛細 遇研 水 光田 黑鉛 天南

たこうら ハン 雄黄丸 瀝研化五丸服之量見大小加減 右以諸般膽汁相和今句即 右為未都研令勻以煉蜜和九如景豆大每服以什 大毎服以金銀湯下五九量兒大小加減 龍膽 麝香細研發 雄黄 治小兒癲發動無時心問吐沫 分 鐵粉研細 鯉魚膽と 普濟方 硃砂 烏牛膽米 · 無子 水 八諸樂末和九如等豆 積猪膽 青羊膽

能膽丹 金分四月五十 天麻散 右為末每服一錢水一盞煎至五分去滓放温服 石同拌匀用積猪膽 雄黄 **羗活** 真熊膽 同研磨精 治癲癇鎮心安神 祛風治癲癇 防風 鐵粉好細 r 明 兩者 川大黄地各 巻三百七十 一枚取汁和諸樂丸如秦 粉霜而 去根節 Ł 兩 兩 水細 分 飛研 **胆麝** ~ 錢 生天南星 耒

雄黃丸 12. 7. 21 Jali 日再覧順亦愈十金方云小兒三九如小豆忌生血 右搏和入塞又搏三千杵為九先食服胡豆大三 吠羊癲則羊鳴鷄癲則鷄鳴五癲病者臓腑相引营 每服十粒至二十粒煎金銀簿荷湯下 衛氣亂厥不識人氣爭對飛吐沫久而得蘇 使八分 金丹方此一味是君 丹石金方二金方水銀出丹二两熬成屑十金丹少半两研左非 出于方用一两 手玉 八金兩 雄貴 明 雌黄一方無一 療五顏牛癲則牛鳴馬癲則馬嘶狗顧則狗 野野方 兩千

金克匹库全書 物 右同研勻滴水和如泰米大每服十粒煎好 金銀箔各三 喃 治癲癇及諸癇胞絡涎盛 研分 兩二慢兩 天南星取未 研同結水 黑錫 沙銀 老三百七十七 于半 涉 粉霜 水銀 細新 兩細 鐵粉 研 各研

一段定四車全書 一門 治小兒癲癇連年不瘥方名水銀九 前人参湯下量兒大小加減一方以硃砂為衣 攪用緊火燒少時都傾出置地一宿出火毒再研和 **り用栗米飯和如菜豆大每於食後服五粒至七粒** 鐺研攪候硫黄煙氣似息次入水銀鐵粉金銀箔同 右先將鉛於鐺子中令消即下硫黃炒不住手就鐺 將錫於錯子內鎔今消即入硫黃炒不住手就 水銀本一 硫黄 鐵粉本 晋祖方

兒大小加減一方食前 右研細如麵以棗肉和九如策豆大每服於食後以 栗米飯丸如菜豆大每於食後以金銀湯下五九量 火燒少時將出置地一宿出火毒後研令極細即以 熟水下三九量兒大小加減 研攪待硫黄煙氣似息入水銀又攪次下鐵粉以武 林沙細研水 治小兒癲癇發歇不定 鉛霜 鐵粉 馬牙硝多

雌黃丸 次に日本人時 加減此方得自明醫之家後亦嘗 石以光明硃砂一 兒癲癇等疾方 九如兼豆大每服以温水下三九日三服量兒大小 (相和細研如粉用牛乳一升慢火 傅與友因施是樂醫道大行 治小兒癲癇欲發精神不足眼目不明恋 令研 褐細 色炒 7 兩顆塊者金箔隨碌砂 黄丹 此今褐 普濟方 麝香 教成膏可丸 分 類塊 Ł 即

金月四月月十十 患者食後以温水調下半錢量兒大小加減服 末偏覆之即置飯甑中然一炊久其碌砂化成水有 露鉛以筋刺得又養七日後去鉛大小煅之候冷取 以鉛片可餅口大小益之以文武火燒七日又常令 即以硃砂置坑子内上更以磁石末覆之斜子口更 各聚之用磁石固濟了餅子內築實中心留一坑子 出於乳鉢中細研即置於通油盒子內上以馬牙屑 治十歲已上願在大陰盛為顧易盛為狂陰 卷三百七十七

次とりも 識邪癲癇小兒客件消食及冷氣 陽相并則瀕狂亂走語言錯雜悲歌不定夢 右以辰砂一兩琉璃器内盛露四十九夜遇陰雨日 不等入牛黄 以鐵屑煎汁服之 更常服寧心膏 治小兒自一歲患癲癇發力 覺呼與不應 一錢煉塞和如疏豆太空心一九冷 普濟方

金光型层 石層 分 炒到 節去 根 南研| 半 雷丸 下量兒 去蘆 半兩 各三 The state of the state of 兩 各半 頻 卷三百七十 加減 研妙酒浸 細辛 × 笛去 各半科学 銀 熬 四 枝 足 梔 白鮮皮

虎睛九 次之日日 二十二月 前大人加九數 右為末米糊九梧桐子大每服湯化下一九量與食 蛇含石四筒建盖内烧紅南星 白附子 辰砂 **环遗失大小便不覺一切編新** 風癎 治小兒五歲至七歲發癲癇無時發動口出 治諸風癲癇掣放吐沫急慢風 ,附論 普濟方 九

夫風癇者由乳養失理血氣不和風邪所中或衣厚汗 崔闘要以三倍脉為主若緊者必風順凡諸癇發手足 學尺寸脉俱浮直上直下此為督脉以腰背强直不得 縮是也於其心脉滿大癇惡筋學肝脉小急亦痼惡筋 金月四月全書 對縮慎勿持捉之則令曲族不隨也 俯仰小兒風癇三倍脉緊急其癇可治小兒之脉多似 出腠理開張風因得而入之先時指屈如數物後乃掣 巻三百七十七 次足りも 釣縣力 源 琥珀 茯神 鈎縣 CILDIN 地骨皮 青谷 翅生 Q 去蘆 天竺黄 兩 普濟方 頭 出出 · 焙對 乾酒 檳榔 黑去心皮 **足去** 頭 金箔 川連 1 龍齒 蚱

虎睛丸 金りというとう 口中白沫大小便不覺 右除另研外為細末軟飯九如黃米大每一歲可服 十九至三十九冬湯或薄荷湯 胡 虎睛人對西浸 蘆 **片各** 同四 研十 苗去 治小兒風癇自三歲已來至十歲不瘥發 鈎縢 半細研各 白鮮皮 おり細研水 卷三百七十七 川升麻 頭去蘆 麻黄去根 雷丸

文とり自己言 成して 丸服之 翅微 足炙 去 以薄荷湯下三九日三服三歲已上以意加 研細 治小兒風癇筋脉抽 石膏和研水彩過 銀屑 普濟方 和搏三五百杵丸如影豆大 細辛 羌活分· ‡

金人巴尼西 調 右為散每服半錢用米飲調下如角弓等風用竹 犀角鏡微 天竺黄研 立参 龍骨別船研如 檳榔 升麻 連夜三四服隨兒大小加減 治大人小兒風癇卒倒嘔沫不醒 雄蠶蛾炒 THE PARTY OF 龍船士 牛黄研 知母幽 各半 巷三百七十七 惧那一枚紙果塘 白茯苓生皮 世 桔梗 中 崇胡 出出 大黄 炒對 鉛縣料 蛯郎は足 防風去蘆 山梔

沙主四事 全島 内杏仁脂葛汁蜜 右切以水六升淡竹瀝二升煮取二 合藥成三四歲一服二合五六歲 翅四足 足 梔子 柴胡 分十 普濟方 知母 芍 煎如 成大 十四 研豆 石膏 F + 服二合半日再 升四合紋 Ż 研 炙七 <u>†</u> **.** 叟去 仁皮 銀箔 t 各尖

龍齒散 金グロル 蒜黏食油腻冷水 服稍增兒若大便潘者加大黃六分慎熱麵炙肉魚 白石脂 研 1:1 甘堂 療大人小兒風癇卒倒嘔沫不醒 石膏研 樂八兩以 炙三 兩 桂心雨三 牡蠣熬 卷三百七十七 赤石脂 蛇蜕皮 紫石英 炙-一 两 かる 四 龍齒 滑石 寒水石

火上日上 二十 犀角散 治小兒心臟壅熱變為風澗引體壮熱 多者日二服三五日一服亦得一方無麻黃龍齒 煮散方寸七取一升去滓服之少小百日服一合熱 不安心神煩問多啼少睡 蜕皮忌海藻松菜生葱軟麵蕎麥猪肉蒜粒食 五合煮取七合絞去滓頓服之日再服1方水二 犀角屑 羗活 川升麻 白鮮皮 為根和到 甘草泰 柴胡 三分 各 炙微 蛇蛇皮灰各

金女中国人主 天竺黄 加減服之 唯為散每服一錢水一盏煎至五分去滓量 八 牛黄 新 新 微剉炒碎 去翅足 炒 龍骨 桔梗去蘆 知母 白殭 枘

次之习事人 炒微 細末以無灰酒 天麻 天南星炮 加減 為細末母服活 炒微 檳榔 **裹一** 微枚 白附子 **馬癇病及諸風丰** 煨紙 小蓋同入銀器內煎今稠再 普濟方 炒細 骨焙烧 乾 蝎 秤去 炒微 日五服隨兒 人搖狗不 古 蜷螂 角屑

金万里近人 不防己酒 瀝下不拘時候量兒大小加减 右都研勻入前膏子為丸如麻子 炙酒 為浸 **木防己**分 後七味同和為凡 殊砂半雨 治小兒風癇發動手足不仁 鉛丹 巻三百七十七 防風 星盡一分 桂 細辛 **天每服三九用** 膩粉 研 當歸 龍齒 虎睛 龍腦 對

次定日中人 紫石酒 右切入絹袋中酒五升浸五宿初服半合日三服 網袋盛清酒五升 分 乾当 治小兒風癇發無時數 遠志去 治少小風痼發作言語診錯 月月 附子 桂心分六 f 分炮|-沒五宿初服一合日二服 普濟方 鐵精 各三 又後風虚不足 炙 盐

金万里尼石里 沉香湯 去津温服日三四隨兒大小加减 乍熱欲成骨蒸腸滑骨熱多變疳痢皮肉乾枯不思 孔食多熟生瘡喉閉腫痛悉主之 桂 炙焦黄 皮士 粗 博節三四成兒每服一錢七水七分煎至四分 治小兒風癇發作無度頭核瘰癧瘴毒乍寒 蚱蟬 卷三百七十 **蚝**郭冬四枚 並 當歸 細辛

哲学力 かんらとりいれています 便發動食飲所傷亦發百脉攣縮行步不正言語不 便者服之永不發 右為散三歲兒以水半蓋樂末半錢七煎至三分去 知母 沉香到 乾薑 不限早晚日三服量兒大小加减 治少小有風痼疾至長不除或遇天陰節變 地榆 升麻 甘草 普濟方 鈎滕 凝水石 土 去粗皮 生薑 炙擦

金分四個 人 雄黄散 服七九五歲已上 惠嬰孺方分兩少異 石為末蜜丸如小豆大三歲已下服五九三歲已 雄黄 甘草 防葵 **茵华紫** 治小兒風癇及天虧宜服 炙 三两 兩 熊膽 鉛丹 昌浦 一服十九十歳已上可至十五九聖 秦片 巻三百七十七 黄芩各 鉤縣皮 天麻 鉛霜 松蘿 各 蜷螂

女正日日 という 間 烏蛇散 專治 錢量兒大小加减服之 並宜服之 右同研如粉常以不津器貯之每服以温水調 天麻 烏梢蛇上兩 川附子 全蝎 天竺黄 一切風癇角弓反張潮搖及心肺中 做炮去皮臍 中和 羗活 白附子 普濟方 白殭婚 石菖蒲節者 半夏分 馬牙硝 內半 + + 去灆 踴 匝

牛黃丸 金岁四月五十 至一盏濾去浑放温時時滴口中 右為麗末每服二錢水二盖生薑十片薄荷五葉前 不休常服除根元 腦子 白花蛇酒 *码* 三 另 錢研 研樂外為未後同研令与煉蜜九一兩作二 治法同前鈞藤九小兒風癇時發時止歲月 麝香 牛黄蜂 人参 巷三百七十七 准兒飯汽 当十 獨活各半

次主四事 一 牛蚩丸 與水銀同研令星盡入前樂末和九如景豆大如隔 右生用捣羅為末以水銀.]兩煮聚三七枚去皮核 良久不醒 凡金箔為衣每一歲兒服一九人參湯 半 治小兒風癇發即迷問手足搖掣口內多涎 乾蝎生 天南星生 水銀 দৌশু 普濟方 白殭難生 半夏湯洗七 白附子 ţ

金グログノ 荆芥湯下兩丸 則頓悶無知口出涎沫或禁不言身反目直 日者每服煎黄牛乳汁下三九日三服如驚風即 竹瀝 治小兒風癇精神昏問遍身肚熱 治小兒風癇痰熱相感而動於心風癇相亂 生地黄汁 防止 一錢水半盞煎三分去滓服 附子此終桂枝去石膏錢二 巻三百七十七 龍腦 生薑 防風

次足引起人 獨活酒 右入絹袋中酒四升半浸五夜初服半 石麗羅為散每服一錢以水 鸠頭 竹歷半合不計時候量見大小加減温服 獨活 危屑 治少小風癇屢經發動 世草 4 桂心兩二 鐵粉 木防已 普濟方 各三 2盏前至五分去 較薑 合日二服 分 細辛 ţ, 去三 翅枝足微 五 炒

輕金月 雄黃丸 不是人口人 人工 石搏研為末用水浸炊餅九鷄頭 腻粉鲜 三歲兒服一九看兒大小加減 治小兒一百二 治小兒風癇瘛癡肚熱凝盛 龍點字半 天南星粒 卷三百七十 蚂梢炒 -種騰風癇病潮發瘛飛 Ł 白附子 為末 ょ 防風 枚二 金箔 剉义

**設定四車全書** 石同研匀细煉塞力 入小加减 二歲一九用金銀簿荷湯化下食後臨即復看小 龍齒 白殭姓 當歸到 治小兒六七歲風痼壯熱 研 去節 題 研為末 2 麝香研名 分 普灣方 九鷄頭大青黛細末聚為衣每 粗 丹砂研水飛 雙仁炒 錢 Ē 膨粉

風丹 温服 風 治小兒風癎先用化風丹 卷三百七十七 錢各半 大麻 防

水銀九 獨活湯 次にり事人時 競痰涎睡即驚悸手足抽掣 右剉用薑煎服 防風 獨活 穌湯亦可一方無甘草有細辛 治小兒心臓久疾風熱發癇或遍身壯熱多 解表通裏風癎内熱 黑鉛 北細辛錢 TO. 內慢火結炒子細半兩同水銀飛過 普濟方 川芎錢 甘草錢 研銚 荆芥穗受 乹 焙 蝎 天麻 枝二 全 頭

比蜕皮散 荷湯下三九量見大小加減 右為末都研令勺用糯米飯和丸如麻子大每 麝紅研分 微尾 炒者 蛇蜕皮质五寸 半微雨赤 治小兒風癇一切端熟 半夏湯洗七 鉛霜 細辛 研半 卷三百七十七 白附子鬼 川大黄平微 炒剉

次之四年之時 一回 新汲水一合打散今勾調下半錢更隨兒大小加减 右細羅為散更研乳入每有疾時取鷄冠血三兩滴 牛黄末一字放温量兒大小臨時加減服 治諸風癇智中 **芜**郎 機炒去 治小兒二十五種風癇無時發動宜服 普濟方 川芒明分三 小盏前至五分去法 天竺黄 Ì

金万里尼人門 溥尚各少許前五分去沒 石搏羅為末同牛黃拌勺每服 获神 肉桂 乾蚱蟬 炙剉 榝 治風澗身體壯熱不除精神恍惚 桔梗 綿黃耆 微七 炙枚 天麻 白鮮皮 獨活 牛黄别研各 卷三百七十七 叶梢熱服 小蓋入判式 羚羊角 一两 鈎藤 錢水ハ分入人 去根節 蛇蜕 細辛 足今黄 防風 兩

次とり事と時 龍齒飲 右為末煉蜜九如麻玉 許煎五分去 龍齒 土 .里 治小兒風癇 治熱風痼 各六 門冬子分 放温服 **捣研各** 梔子仁 普濟方 分 大食前缀水下二三十九 龍齒 春各一兩判炒今黄 7 Ξ

升麻飲 金分四個人 右麗研搏篩三四歳兒毎服一錢七水七分煎至 浑連夜三五服隨兒大小加减 右羅持篩 足三枚五五翅 治小兒風痼 治小兒風熱發痼 一日三四服隨兒大小加減 寒水石一两 鐵粉研 二歲兒每服 巻三百七十七 黄芩去黑心 一錢水半蓋煎至三分 蛇蛇皮五寸 四 炒細

27.77.2 /11 白鮮皮 湯 右㕮咀以水二升半煮取一升二合分五服日三芳 石麗梅篩三四歲每服一 玄參 白鮮皮 細辛 日三四服隨兒大小加減 治小兒風癇胃中有广 鉤滕 鉄三 犀角炒做 蚱蟬 松二 善所方 四如人 大黄松四 一錢七水七分煎至四分去 麥門冬 有月月 蛇蜕皮 各半兩 有再 1

牛黄九 金好四個全書 牛黃丸 服已盡而痼不斷者可更加大黄鉤縣各一銖以水 右為末以煮聚去皮核取肉和水銀半錢研極細次 **清樂半日然後煮之** 樂末和九如張豆大每服一九荆芥生薑湯下 風 牛膽汁和南星末風 治風痛迷思抽掣涎潮 治小兒風癇發動無時肚熱心煩筋脉拘急 白附子 生 巻三百七十 天麻 全蝎 直殭麵數半 Ł 與殼錢半

七寶鎮心丹 兒大小加减 右細羅為散 石為末以聚肉和丸如策豆大每服以井 虎睛 世對 分 半本内各 治小兒風癇並心熱多點 酒 用 微七 炒枚 不計時候以温竹瀝半合調下 浸 加 **羗活** 各五 飛細研水 脳麝かる 雄黄 琥珀

一起定四庫全書 哲泉浦丸 菓物樂宜長服之 晚以飯下不但治疾無令人壽忌羊肉血飴糖桃 右為末蜜和九如泰米大每食了服十五九不拘早 九日三服量兒大小加減 当浦石上一 治諸種風癎 治少小熟風癇兼失心者 地骨皮 一寸 宣連 巻三百七 † と 車前子 生地黄

EX rad Distant 白鮮皮湯 右羅持篩五歲六歲兒每服 分去滓入牛黄末少許日夜三四服隨兒大小加减 右一處拌勺每服一字至半錢煎乳香湯調 白鮮皮 大黄 期村馬木用 乾蜣螂 微炒 **今對** 黄辟 熟炒 治小兒風癇疾骨中痰涎 細辛 甘草三分 嚴靈仙光好 去苗 普濟方 川芒硝 炙剉各 釣藤各半 錢七水七分煎至四 天竺黄同細 蛇蜕皮五寸灵 天麻 蚱蟬 芸 微泉

多好四月全書 透羅力 虚實與吃 石脳油和丸如梧桐子大每服! 右先將天南星乾蝎細羅了同研藥入乳鉢細研 紀即加二九小兒 粉霜 結為沙 治風癎多困不醒 祈 治小兒風癎多熱瘛癡强直反張 錫 子 乹蝎 腻粉錢-卷三百七十七 歳以下每服 分 龍齒 天南星生用 一九温涛荷水化 研 九臨時相度

たこうら こす 痛 生五分-石為末每服 乾量处 細辛 去苗 去滓温服 犀角 二歳兒每 當歸 治小兒風癇撮口天虧諸澗及積縣 一錢用水二盞入生薑二片 廿堂 方酒調下 普濟方 炙剉各 一錢七水半盏前至三分 蝎梢 主 剉炒 轨 今 畃

金只四月全書 醒 灌之便定兒稍大則以防風湯調末服之又驚癇用 右用取蝎五枚以大石榴割頭去子作瓮內蝎其中 小兒風癎 風前 以頭益之細節和黄泥封聚以微火炙燒今通赤良 蛇黄以水磨服 久去火待冷去泥取中焦黑者細研乳汁調半錢七 服至夜今盡隨兒大小加減 小兒風癎延潮發搖不省人事 巻三百七十 **皮** + 代金 ¥ 方 草丹

交正可与 八五方 薄荷温水化破服之量兒加减服 右研為細末煉蜜和為膏甕合內收每服一張豆 丹砂 銀 一視及風蘊痰實心膈滿悶嘔吐痰涎 煉十 半全 兩者 遍 治小兒職風壯熱涎多發痼手 龍點分半 秤三 煮半日候雨與水銀 普濟方 兩 麝香纸半 冷結 取甘草細的少子分為 蛇頭 天南星 者生 枚 主 自 炮為 研 用 開 分 揌


細字 金只四月全書 用簿荷蜜湯下以和為度未利 右對散每服三字入學 石同研細以麵糊為九如麻子 天麻 治風痼内熱 小風癇晝夜 **内各** 卷三百七十 細辛 許同煎服 Ł 豥 歳兒服

水銀丸 欠こりと 服日夜再服 右細研水銀入棗肉丸如梧桐子大塞水化二丸 右以水一升先煮麻黄五沸去沫內諸樂煮五合題 炙 / than 治風痼 治風癇解 雄黄 黄芩 普濟方 輕粉 主

金分四月全書 黄散 右剉散每服三字薑三片煎服有內熱加天麻防風 細辛 右細研為散不計時候熟水調下半錢量兒 口天齊驚風 獨活 錢半 | 錢犀角少許去麻黃獨活 治小兒風癇睡中驚呼兩眼縱露及臍風撮 鉛霜分 川岩錢一 巻三百七十七 天竺黄 兩半 馬牙硝 兩 各炙

黑金丹 万人ととりもしとと言う 細辛大黃湯 减服之 右㕮咀每服 治癇宜服薄荷散又宜服細辛大黃湯有熱即服之 二分服 炙 細辛 治小兒風癇手脚抽製 上站 治風癎有熱風癎者當散其風邪然 一錢水 大黄地雨 普濟方 半盏加犀角屑少許同前至 丁翻眼吐沫久患不可 防風 去 蘆 主 甘草

金人口吃人 雷九膏 者 九服之兒稍大以意加之 末和勻以糯米飯和九如景豆大一歲兒乳汁研 石先鎔鉛為汁次下水銀結為沙子細研與天南星 右先煎豬脂去滓下藥般火上煎七沸去滓逐痛 雷九 黑鉛 治小兒風癇掣飛戴眼極者日數十發 茶草子黄大 水銀 各如鷄 天南星北谷半雨為 卷三百七十七 THE RESERVE AND THE PROPERTY OF THE PERSON O



治風癇及小 磨刀散 治一切風癎 金グロルノコ 乳汁下一丸良久吐出黏涎神效稍大加九數服 右為末拌勻每服半錢以磨刀清水調下不拘時候 右以聚熟同研今黑星盡九如紫豆大一歲兒每服 **木賊** 半兩 生黑豆木 雕茶一錢 ・ナン

术湯浴方 宜矣頭上旋毛中小姓勿令大三姓記乃浴洗 煎如上法 右用白术伍兩粗擒米泔浸一宿至明用慢火煎五 七沸以適寒温洗兒頭及身即愈一法用菖蒲五兩 右以芭蕉自然汁時呷一兩口甚者服五升公效 見點風加麝香更佳 嬰孩風癎 治小兒風癇學處身體汗出獨頭無江 普濟方 幸

定搖為已成痼其風不散若更攻擊即街任百脉雖 至少巴尼 石量 之風不待久傳迅變凡患五臟縊熟三焦作壅速與流 論曰風之為病其狀亦多端皆由奏理疎弱崇衛虚怯 化之即順助其榮衛經絡乃得流行自若也便與截風 利熱即風生壅即風長關竅不通其風何能自散盖必 四體皆不我有是謂風痼之至也所謂化風化其所受 有同天地晦冥日月暈蝕髮暴發與精神俱潰者一身 絡不順關竅閉塞其氣霾盛費勃布其脉凝注征役 ż x

比金丹 能發作畢竟隐伏久而再發無能去根此方得名化風 較他方加進矣 荷湯化下議日風行於四時和順於內外長養萬物 能生能敗法今至周惟風之徳夫人一身亦同天地 右為細末煉蜜為九皂子大每服一錢煎金銀簿 石菖浦 川芎 甘草一分 天南星 藍汁製 參 白茯苓 遠志,山樂

多定四库全書 變於多為害當用逐之何况童稚幼雞嫩嬌肌脆百 前釋化不盡者正謂庸醫之陋也善治難相者化 審詳隨其順逆以療之襲逐在後頂追不及所載在 其痰和其氣鎮心神安魂魄通關竅順經絡使其榮 病總歸於風宣可取次陳怠此治風有法度可不極 力施功若停待俟須臾而更愴惶即扯謬而失深意 有其痰與熱而發其點屬竅不通氣脉流注逐有傳 順則和逆則害所發之風因其虚而入應其熱而生

次記事人馬 治心熱風痼 暑知時臟腑常固其經絡自和樂衛自順比金之名 衛常順流行調其臟腑長和充實邪自何生風從何! 决定不謬此盖順調善攝而己 令血脉充肌膚壯頭目清精神備飲食節睡即穩寒 右以爛龍角濃汁研取汁食前服三合日再服 雖有此小自然而散此痼由點為疾宜可留滞當 食癎 附論 普齊方 吉田

致煩毒之氣入於乳中因積乳兒令氣血不調腸胃否 |臓腑壅滞内有精熟或乳母飲噉五辛毒物志怒無節 相引目睛上搖手足掣飛背脊强直或頭項反折比由 金グロルノコ 塞故北熱多驚四肢抽掣是為食癎之病 小兒發癇凡因乳哺不節而成者食癇也其證口眼 治小兒食癇及疳黄 白丁香分

次にり上へいま 石為末拌勺稀麵糊為九如黄米大捏作餅了 枝二微炒五 南星 - 末 錢各 治小兒食痼 水一般細細研 金箔片 細 銀箔片 普濟方 川大黄微泉 桂心 期稍末 -更量兒大小加减 雲母石 水銀沙子級中 乳香麻 滑石末 **礬石**\* 犀角 丰 半細兩研 屑 各

代赭九 金少四月五十 兩九三歲至七歲以粥飲下五九量兒大小加減服 痰涎壅滞發歇不定 石為末煉塞和丸如黍米大百日内小兒以乳汁下 代赭 剉 治小兒食癇四肢抽掣肚熱驚悸乳食不消 巴豆去皮心膜炒 砂の新知 - 去 雷丸 南研 卷三百七十七 馬牙硝 金銀箔各三十 川大黄 数舜 製炮

文とり自人 九日三服量兒大小加减 龍點鄉研 记為末煉蜜和九如泰米粒大每服 治小兒食癇及驚風百病 麸炒微黄各一分湯浸去皮火雙仁 對微 蚂科 极做 普灣方 油心 硃砂 炒九 БĤ 麝香半錢 膨粉 各細 赤 赤炙剉微 有蟲者炒二十七枚 犀角屑 主 内

金分四月年書 牛黄丸 右為末用糯米飯和九如菜豆大每服以荆 不節腹滿温熱朝夕發甚者大小便不通脾胃氣弱 九量兒大小加减 一剉两炒 去油各半兩去皮心紙果 治小兒食癇瘛凝及諸變然腹中宿落飲 নিয় নিয় 雀屎白 炒半 街者 當歸 卷三百七十七 **一 細** 分剉 甘草次三 内 苦窮 柯

次に日日 八十二 金箔丸 量兒大小加減 濕紙表燒火灰煨匀熱候冷取研九如菜豆大每服 右研令勻以電瓤和成劑子以五片金箔眾上更着 一九二三歲如亲豆大三九並用米飲下微利為京 石為末與巴豆膏和勺煉蜜為九一歲兒如泰 金箔細好 巴豆紙表壓去油 治小兒食痛墜痰涎 脱粉 普濟方 甘遂一分煨微 Ī

金分四月全書 **驚風天瘹** 以人参湯下二九量兒大小加减 砂 真珠細研 白茯苓士黑皮 **表去**油研 治小兒食相魍魉三十六種無辜五疳 壮蝿 各一兩 外捣羅為末|處研勻 牛黄細研 盡如半膏 ち樂 か 卷三百七十 虎睛 一對炙 杏仁去皮火雙仁 ż 甘草 `煉蜜九如麻 ---半炙 兩研 半两炒 半切购炒 丹

淡足り事人 麝香丸 閃癖食癇天行赤眼急黄一切病並皆宜服 脳青色效量兒大小加减 每服一 麝香細研 **遇粉** 一分税 如粉一分教別持羅研 一分 九至二 治小兒諸疾一歲已上三十六種無 虎睛三枚微 一九米飲或桃仁湯下取下惡物如魚 白茯苓去黑皮 普濟方 半細兩研 丹砂、 巴豆 啊 **上**中青三分 廿遂 杏仁头雙二 ÷

金がせんとろう 牛黄丸 右除巴豆外各 石為末入研了 八審器中貯候服取二九如麻子大温水下隨兒大 麝香半分 牡蠣粉 加减 牛黄 治小兒食痼乳癖積聚壯熱心神多點 硃砂 甘草炭微 ,樂同研令勻煉塞和九如麻子 巴豆然是壓去油研 搏研為末入巴豆煉蜜和擣三子 鉛霜各細 卷三百七十 杏仁研如膏各一分 Ł 真珠末 犀角屑

次をりました時 妙聖丹 香湯下量兒大小加減 **歲兒以金銀簿荷湯下二九量兒大小加减** 石拌匀滴水和丸如黍粒大每服三粒至五粒磨 枚四 微十 紙裹打 治食癎利胃膈 代赭石 錢 已上捣羅為細末次用 龍腦 馬牙硝 研申錢 脱粉分半 川大黄 地谷 巴豆膜之 充

金次巴尼石量 利兩三度勿怪更隨兒大小加减 石為末煉蜜和丸如黍米大每服以粥飲下三丸 雄黄 微-黄分 一分煨 · 赤湯 皮洗 治小兒食癇化聚好食痰隊 治小兒七歲已下食癇肚 卷三百七十七 蠾 ŔĐ 涎利大肠 炙微 半膜 水各 兩紙 飛細 遇研

万人とり 日本 **薑湯下二九量兒大小加减** 右諸件樂都研為末煉塞和九如景豆大每服以生 十枚 霜 末以糯米飯和九如黍米大每服以粥餃! 褐色與 十粒用油煎今 治小兒食癇心胃痰滞去 腻粉 滑石两 各半 硃砂 普濟方 蛇蛇皮是條 天竺苗 麝香各半 - 並 分細 研 中 肥

妙聖丹 金公四月五十 蟾酥丹 放温冷下量兒大小加減 石為末糯米飯為九如黍米大每服; 凡量兒大小加减 蟾酥 蠣 代赭石 粉 治食癎毒盛湯樂不下 治食癇通利 犀角 醋淬 麝香錢 卷三百七十七 雄黄 甘草 巴豆皮 蝎稍 煨慢 黄火 杏仁皮炒去 牡

夕にり巨 二手 服以温水下五九量兒大小加减 右為末細研今与煉塞和丸如黄米大一二歲兒 F 石為末濕囊肉丸如桐子大每服一九木 粉 去皮心 油 治小兒食順喘息氣魔 天竺黄 普濟方 雄黄 以一 |膜粒| | 研如膏各一分湯浸去皮火雙仁 丁頭代赭 杏に 早二 為搗 炒去

金万四月全書 紫霜丸 便利不調乳食减少又治傷寒温肚內挾冷實大便 化下 右同拌勻煉塞和丸如雞頭大服一粒至二粒麥湯 酸臭或已得汗身熱不除及變蒸發多日不解因食 毵仁為表一分 治乳哺失節宿滯不化胞腹痞滿嘔吐惡心 治食癎利貿膈 真珠 卷三百七十七 雄黄 明者細研 丁頭代赭石 精 未為 白殭蠶

政定四事人等 一門 靈脂丸 右研細如粉用烧栗米飯和丸如黄米大一二歳每 或米飲下微利為度量兒大小加減 成癎先寒後熱並宜服之 右件合研細湯浸蒸餅丸如麻子太每服三丸乳汁 硃砂 代赭石斑醋 研 治小兒食癇乳食不消心腹壅滯四肢發 杏仁 光鼓炒别研 五靈脂分一 赤石脂、肉 普濟方 巴豆裹出油 裹出油 細研五枚去皮心纸 巴豆炒三十 甲二 油粒 細土

鉛霜丸 多りせん 反目口吐涎沫名為食瘤 服用温水下二九以吐利為妙量兒大小以意加减 石為末以糯米飯和凡如粟米-鉛霜 執癎 熱痼者由血氣不和內有積熱之所致也 九三歲已上加九服 治小兒乳食不消心腹結實出 腻粉谷 附論 卷三百七十 巴豆然表出 Ł 每服以通 油研 熱煩悶搖

ち楽カ 狀口眼相牽手及抽牽口中吐沫鼻內作聲頭項反張 次とり巨 腰背强直身體比熱或中或啼者是熱癇之候也宜 滞温指生熱不得宣通熱極甚者則發癇也又心神多 不寧將養過温內生邪熱所以多點甚者變成諸痼其 骨體輕軟腸胃細微易為傷動若乳食不常臟腑 方 こう 治少小 百二十雅小 普濟方 職常服除熱疾 四十二

金万四月全書 稍增可至四五九 石為末煉塞和九如麻干 者 研 死 煩悶 石膏 龍骨研 當歸 卷三百七十七 細辛 各五 定眼目直視自 服二九日三如不 樂士 苗

紫石其散 7 如亲豆大每服以竹瀝研五九服量兒大小加減 遊 連 微皮 研 1.1. 鈎牒 黄卷生二 **两**細 治小兒熱癇四肢抽學每日 各 侞 三仁分匙 龍膽 蚱 梔子 ·樂同研令句 普濟方 頭去 去三 翅枚 足般 川大黄似 ·煉蜜和九二三百杵 **片各** 細五 胁 研十 犀角 炒碎 数發宜服此 19+E 過細 水 胡酱 服

到於四庫全書 **鉤縣湯** 除熱鎮心 右為末每服以温薄荷湯下半錢量兒大小加減 犀角屑 鈞滕 紫石英 石 两各 療未滿月兒及出月兒壯熱發痼 去一皮分 土黑 兩各 龍齒 甘草 蚱蟬 卷三百七十七 飛細 研雨 遇研 翅 牡蠣 滑石 下熬 分粉 過研 白石脂 柴胡 水 蛇蜕皮 寒水 炙微

便停後至五六十日兒 右切以水一升煮三合半和竹瀝服1合得利下即 凡 获神 白鮮皮 **方連發不醒加麻黃,一分去節** 瀝 龍齒 治小兒食痼皮肉肚熱煩躁頭痛宜服此樂 川升麻 羚羊角 兩屑 南 鉛藤 皆南方 服一合以外忌海藻 甘草 石膏 赤炙剉微 1 犀角 分名 翅微

多定四庫全書 白鮮皮散 身體如火 石粗羅為散每服一 右為散每服一錢以水 **大小加减温服** 甘草 角 白鮮皮 治小兒百日以來至三四歲發熱痼瘛瘲 胡黄連分三 黄芩 一銭以水 川升麻 一小盏煎至五分去清量兒 小蓋煎至五分去滓 地骨皮 龍齒 鈎縣

次足可戶 鈎縣散 麻散 大小加减 石為散每服 剉 石膏 牛蚩末 川升麻 ALC: 治小兒風壅氣盛心胃痰滞以 治小兒熱威迷問發癎 分别接候湯成炒各三分嬰孺 龍齒 字量兒大小加減温服 鈞藤 一錢水 普濟方 史君子 小蓋前五分去滓温服量兒 柴胡 和 方用大 用 畄 去 赤芍樂 壯熟發痼 朴硝 1 兩各

金光中尼人里 合量兒大小加减 犀角 蛇蜕皮质 焙 去二 翅股 卷三百七十 盏煎至五分去造入竹 栀子仁 ید 去三 趙枚 足微 炒

文三日三二 石為末合諸樂同研令与煉塞和凡如景豆大 石為散每服水一 温服量兒大小加减 ৰ্ম্য 蘆去 兩去 治小兒熱癇搖頭吐古四肢抽掣 小蓋入苦竹葉七片前至五分去 普濟方 麝香 犀角 鈎縣 群砂 紅 四十七

治小兒癇病熱多者方 金分四月全世 瘥 食前取一匙和蟬殼湯及酒服之日再服重者一月水 右以五升大斗煎取一斗半去滓澄清濾煎如錫每 兒金箔研化一九日三服 牡荆子 無洗淨 布一袋 菜 菜 半 卷三百七十七 生鐵一大片 甘草 枘 里

蟬殼散 久己可臣 /三 右細研勻每服半錢煎剂 右以臘雪略温服之 黄 蟬殼 分 研 治小兒熟癇嘔逆煩思體熱 治諸癎挾熱 **牡蠣** 二分 | 捣羅為細末次用 頭去 蘆 去蘆 頭 普濟方 犀角屑 新岭 介海荷湯調下 赤剉 炙微 一分 型 天竺 鎰

金好四月全書 栀 加减服力 石為散每服一 石為散每服 获神 焙 兩去 一錢水 兒體熱嘔吐發痼 巻三百七十七 鈎膝 盏前至五分 小蓋煎至五分去滓温服 迷 兩土 周嚼者仰目 Ξ 分土 去适量兒上

. ) 量兒大小加减服之 石為散每服 1.1. 治小兒熟願 另細入研 土翅足 炒 |錢以水 | 蓋前五分入竹瀝 普齊方 研炒 各半两炒 鈎縣 一前至五分 頭去蘆 古渣温服 野

金丘匹庫全書 治小兒十歲已下及新生百日無問癇熱無辜疾癖 右以京三稜汁作粥與食之秘妙不可具言大效 許去滓入牛黄一字大小量服 瀬方巻三百七十七 **順執時氣煩悶上渴** 青岩衣煮服 Ņ 老三百七十七